

INSTRUCCIONES PARA COLONOSCOPIA

PREPARACION:

Omita los anticoagulantes (Plavix, Coumadin, Warfarin) 5 días antes de su examen. No tome medicamento de Diabetes el día de preparación y día de colonoscopia. Para pacientes con Insulina, tome únicamente la mitad (1/2) de su dosis el día de preparación y el día de cita. Tome su medicamento para el Corazón y presión arterial como siempre.

EL DÍA ANTES DE SU COLONOSCOPIA, POR LA MAÑANA, MEZCLA LA SOLUCION DE CONTENIDO GOLYTELY/ PEG 3350/TRILYTE NULYTELY CON AGUA HASTA LA LINEA MARCADA EN EL FRASCO, AGITE Y PONGA EN EL REFRIGERADOR.

Dieta de líquidos claros únicamente un día antes de su colonoscopia.

5:00PM Tomarse la mitad del contenido de Golytely. Tomese 1 vaso cada 10 a 15 minutos. Tome cada vaso rápidamente en vez de tomar pequeñas cantidades continuamente.

Seguir la dieta de líquidos claros.

_____ El día de su cita, tomarse la otra mitad de Golytely, , procurando acabar 2 horas antes de su colonoscopia.

Es importante que tome TODA la solución.

Pídale a otra persona que conduzca, porque usted estará bajo los efectos de sedantes, SEA PUNTAL. Solicitamos que su conductor permanezca durante su cita.

Dejar de tomar líquidos 2 horas antes de su cita. _____

Por favor use zapatos y ropa cómoda

Tucson Gastroenterology Specialists, PC
3040 N. Swan Road, Tucson, AZ 85712
Phone: (520) 327-3454
Fax: (520) 327-3431
www.tucsongastro.com