

## INSTRUCCIONES PARA COLONOSCOPIA

### PREPARACION:

Omita los anticoagulantes (Plavix, Coumadin, Warfarin) 5 dias antes de su examen. No tome medicamento de Diabetes el día de preparacion y día de colonoscopia. Para pacientes con Insulina, tome unicamente la mitad (1/2) de su dosis el día de preparacion y el día de cita. Tome su medicamento para el Corazon y presion arterial como siempre.

EL DIA ANTES DE SU COLONOSCOPIA, POR LA MANANA, MEZCLA LA SOLUCION DE CONTENIDO GOLYTELY/ PEG 3350/TRILYTE NULYTELY CON AGUA HASTA LA LINEA MARCADA EN EL FRASCO, AGITE Y PONGA EN EL REFRIGERADOR.

Dieta de liquidos claros unicamente un día antes de su colonscopia.

5:00PM Tomarse la mitad del contenido de Golytely. Tomese 1 vaso cada 10 a 15 minutos. Tome cada vaso rapidamente en vez de tomar pequenas cantidades continuamente.

Seguir la dieta de liquidos claros.

El dia de su cita, tomarse la otra mitad de Golytely, , procurando acabar 2 horas antes de su colonoscopia.

Es importante que tome TODA la solucion.

Pidale a otra persona que conduzca, porque usted estara bajo los efectos de sedantes, SEA PUNTAL. Solicitamos que su conductor permanezca durante su cita.

Dejar de tomar liquidos 2 horas antes de su cita.

Por favor use zapatos y ropa comoda

**Tucson Gastroenterology Specialists, PC**  
**3040 N. Swan Road, Ste. B\* Tucson, AZ\* 85712**  
**Phone: 520-327-3454 Fax: 520-327-3431**